

5th National Audit Project – Accidental Awareness During General Anaesthesia

Moderne anæstesi har ændret vores opfattelse af acceptabel lidelse, vores humanisme - og det er et guddommeligt tryllesnummer. Omvendt proportionelt er det helvede, der åbner sig for den enkelte patient, når han pludseligt og bevidst befinder sig midt i sin egen operation.

Men hvor hyppigt forekommer awareness? NAP 5 benytter det omfattende indrapporteringssystem, som englænderne dygtigt har formået at applicere til flere centrale anæstesiologiske problemstillinger, og nu med det formål at kortlægge forekomsterne for awareness hos forskellige patientgrupper i det britiske sundhedssystem.

Resultaterne viser overraskende lave forekomster af awareness, 1:19.600 anæstesier for alle generelle anæstesier og med øgede forekomster hos "the usual suspects", nemlig relakserede patienter (1:8.000), hjerteoperationer (1:8.600) og kejsersnit (1:670). Ikke-relakserede patienter havde en forekomst på blot 1:135.900.

Ved prospektive undersøgelser er hyppigheden for awareness omkring 1-2:1.000 (eks. Avidan et al, NEJM 2008). Her udspørges patienterne systematisk efter et Brice Questionnaire. Alle episoder af awareness - fra de næsten tvivlsomme til de mest brutale - registreres. Det er formentlig i studiedesignet at diskrepansen mellem forekomsterne opstår. I NAP 5 bliver de atraumatiske awareness episoder måske ikke indrapporteret, og måske heller ikke de værste tilfælde, hvor indrapporteringen i sig selv kan være for smertefuld for patienten?

Læs mere her:

Pandit et al, 5th National Audit Project (NAP5) on accidental awareness during general anaesthesia: summary of main findings and risk factors, BJA 2014, 113 (4): 549–59

Fuld rapport: <http://www.nationalauditprojects.org.uk/NAP5report>

Martin Kryspin Sørensen
Emneredaktør